

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :**Composition qualitative et quantitative :**

Sulpiride : 100 mg.

Excipients : Chlorure de Sodium, acide sulfurique pur et EPPI qsp 2 ml.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antipsychotique neuroleptique.

INDICATIONS :

Traitement de courte durée des états d'agitation et d'agressivité au cours des états psychotiques aigus et chroniques (schizophrénies, délirés chroniques non schizophréniques : délirés paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques).

CONTRE INDICATIONS :

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit.

- Tumeurs prolactinodépendantes (par exemple adénome hypophysaire à prolactine et cancer du sein).

- Phéochromocytome, connu ou suspecté.

- Sultopride.

- Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline, entacapone, lisuride, pergolide, prîbédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole).

POSOLOGIE :

Le médicament est réservé à l'adulte.

La posologie varie selon l'indication. Elle est de 400 à 800 mg/jour, pendant deux semaines.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie injectable intramusculaire.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**Grossesse :**

L'utilisation du sulpiride est envisageable quel que soit le terme de la grossesse en respectant la durée du traitement et les doses indiquées par votre médecin.

Allaitement :

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement en raison du passage du sulpiride dans le lait maternel.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**Mises en garde :**

• En cas d'apparition de fièvre non expliquée, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

Précautions d'emploi :

Il est nécessaire de prévenir votre médecin en cas de :

- Maladie cardiaque
- Maladie de parkinson
- Insuffisance rénale

La prise de boissons alcooliques est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN FIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, NOTAMMENT CERTAINS MEDICAMENTS DONNANT DES TROUBLES CARDIAQUES GRAVES TELS QUE LES ANTIARYTHMIQUES, LES NEUROLEPTIQUES... , IL FAUT SIGNALER TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN.

EFFETS INDESIRABLES :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Troubles endocriniens : absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement du lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement.

- impuissance, frigidité.

- Prise de poids

- Somnolence

- Tremblement, rigidité et/ou mouvements anormaux.

- Sensation de vertige lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout.

- Troubles du rythme cardiaque

- Exceptionnellement : fièvre inexplicable, sudation, pâleur, modification de la tension artérielle, altération de la conscience, rigidité musculaire.

N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien et à signaler tout effet non souhaité et gênant, et qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

Pas de précautions particulières de conservation.

DELIVRANCE :

LISTE I (TABLEAU A) : SUR ORDONNANCE MÉDICALE.

FORMES ET PRESENTATIONS :

DOPRID 100 : boîte de 4 ampoules.

AMM N° : 9313081.

DOPRID 100: boîte de 50 ampoules.

AMM N° : 9313082H.

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

DOP10412 V01