

# DOPRID PER OS

SULPRIDE 5 mg/ml

Solution buvable



## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

### Composition qualitative et quantitative :

Sulpiride : 1000 mg.

### Excipients :

Hypromellose, cyclamate de sodium, acide citrique monohydrate, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, acide sorbique, acide chlorhydrique, arôme et eau purifiée qsp 200 ml.

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antipsychotique neuroleptique, Benzamide.

### INDICATIONS :

-Traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété de l'adulte en cas d'échec des thérapies habituelles.

-Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies) chez l'enfant, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

### CONTRE-INDICATIONS :

N'utilisez jamais ce médicament, dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit.
- Tumeurs prolactinodépendantes (par exemple adénome hypophysaire à prolactine et cancer du sein).
- Phéochromocytome, connu ou suspecté.
- Sultopride.
- Agonistes dopaminergiques.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

#### Posologie :

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas.

*DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.*

#### Voie et mode d'administration :

Voie orale.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

##### Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Dans ce cas, il faut respecter rigoureusement la posologie indiquée.

##### Allaitement :

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

#### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

##### Mises en garde :

- En cas d'apparition de fièvre non expliquée, de pâleur ou de

forte transpiration, il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

##### Précautions d'emploi :

Il est nécessaire de prévenir votre médecin en cas de :

- Maladie cardiaque
- Maladie de parkinson
- Insuffisance rénale

La prise de boissons alcooliques est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.*

##### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de parkinson et certains médicaments donnant des troubles cardiaques graves tels que les antiarythmiques, les neuroleptiques... IL FAUT SIGNALER TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN.

##### EFFETS INDESIRABLES :

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :*

- Troubles endocriniens : absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement du lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement,
- Impuissance, frigidité,
- Prise de poids,
- Somnolence,
- Tremblement, rigidité et/ou mouvements anormaux,
- Sensation de vertige lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout,
- Troubles du rythme cardiaque.

Exceptionnellement : fièvre inexpliquée, sudation, pâleur, modification de la tension artérielle, altération de la conscience, rigidité musculaire.

*N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, ET QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.*

##### CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de prise d'une dose excessive de médicament, UN MEDECIN OU UN SERVICE D'URGENCE DOIT ETRE IMMEDIATEMENT CONTACTE.

##### PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

##### DELIVRANCE :

Liste I (tableau A) : Sur ordonnance médicale.

##### FORMES ET PRESENTATIONS :

DOPRID per os : 1 flacon de 200 ml.

AMM N° : 9313083.

### Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas, n'en augmentez pas le doses sans consulter votre médecin.

**Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.**

DOP20112 V01

Fabriqué en Tunisie par les laboratoires pharmaceutiques DORCAS

Z.I. KONDAR 4020 SOUSSE, TUNISIE

Tel : (+216) 73 389 794 / 795 Fax : (+216) 73 389 796