Ibuprof per os
Ibuprofène
Enfants et Nourrissons

Suspension buvable à 100 mg/5ml : flacon de 125 ml

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Ibuprofène (DCI)…….....100 mg

Excipients :

Saccharose, glycérol, sorbitol, polysorbate 80, benzoate de sodium, saccharine sodique, gomme xanthane, acide citrique, arôme et eau purifiée……..…qsp 5 ml

Excipients à effet notoire :

Saccharose, glycérol, sorbitol, sodium.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Anti-inflammatoire non stéroïdien.

INDICATIONS :

Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou fébriles.

CONTRE INDICATIONS

- Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus).
- Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proche telles qu'autres AINS, aspirine.
- Antécédents d'allergie à l'un des excipients.
- Ulcère gastroduodénal en évolution.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Insuffisance rénale sévère.
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
- Lupus érythémateux disséminé.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé au nourrisson et à l'enfant de 3 mois à 12 ans (soit environ 40 kg).

La posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 à 4 prises, sans dépasser 30 mg/kg/jour. Le médicament s'administre au moyen de la seringue pour administration orale (graduée en kg), qui délivre une dose de 10 mg/kg par prise.

La dose à administrer pour 1 prise est obtenue en aspirant la suspension, en tirant le piston de la seringue pour administration orale jusqu'à la graduation correspondant au poids de l'enfant.

Pour chaque prise :

- jusqu'à 10 kg : remplir la seringue jusqu'à la graduation indiquant le poids de l'enfant ;
- entre 10 et 40 kg : Remplir une première fois le système doseur jusqu'à la graduation 10kg puis d'autres fois jusqu'à atteindre un total égal au poids de l'enfant ;
- au-delà de 40 kg (soit environ 12 ans) : il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.

A titre indicatif,

Poids de l'enfant (Kg)	*Volume administré par prise (en ml)*
1	0,5
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
7	3,5
8	4
9	4,5
10	5
20	10
30	15
40	20

Fréquence d'administration :

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Mode d'administration :

Bien agiter le flacon avant l'emploi.

Faire boire de l'eau après absorption de la suspension.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
- .Ce médicament contient du glycérol et peut provoquer des céphalées et des troubles digestifs (diarrhée).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Ce médicament est destiné au nourrisson et à l'enfant. Cependant, en cas d'utilisation dans des circonstances exceptionnelles chez les femmes en âge de procréer, il faut rappeler les points suivants :

Grossesse

- Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation d'Ibuprof per os ne doit être envisagée que si nécessaire.
- Entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée (entre le début de la diurèse foetale et 5 mois révolus) : une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une prise prolongée est fortement déconseillée.
- Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) : toute prise, même ponctuelle, est contre-indiquée. Une prise par mégarde au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance cardiaque et rénale, foetale et/ou néonatale selon le terme d'exposition. La durée de cette surveillance sera adaptée à la demi-vie d'élimination de la molécule.

Allaitement

Les AINS passant dans le lait maternel, il convient, par mesure de précaution, d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUTE SUBSTANCE ACTIVE, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

Possibilité de troubles digestifs et de diarrhées (en raison de la présence de glycérol et de sorbitol).

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

FORMES ET PRESENTATIONS

IBUPROF per os, Suspension buvable à 100 mg/5ml : flacon de 125 ml.

Délivrance : Tableau C, Liste II

AMM N° : 9313221

Ceci est un médicament

Un médicament est un produit, mais pas comme les autres. Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.

Suivez le conseil de votre pharmacien.

Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.

Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Fabriqué en Tunisie par les laboratoires pharmaceutiques DORCAS
Z.I. KONDAR 4020 SOUSSE, TUNISIE
Tél : (216) 73 389 794/795 Fax : (216) 73 389 796