



IDENTIFICATION DU MEDICAMENT:

Composition qualitative et quantitative:

Kétoprofène:100 mg.
Alcool benzylique:50 mg.
Excipients: arginine, acide citrique monohydrate et
EPPIqsp 2ml.

Chaque ampoule contient 2 mL de solution injectable.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE:

Anti-inflammatoire non stéroïdien: (Muscle et squelette).

INDICATIONS:

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans):

- Traitement symptomatique de courte durée des :
 - Rhumatismes inflammatoires en poussée ;
 - Lombalgies aiguës ;
 - Radicalalgies ;
 - Traitement des algies d'origine néoplasique,
 - Traitement des crises des coliques néphrétiques.

CONTRE-INDICATIONS:

Ce médicament est contre-indiqué dans les cas suivants:

- Hypersensibilité à l'un des composants du médicament.
- Antécédent d'allergie ou de crise d'asthme déclenchée par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté (autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).
- Hémorragie gastro-intestinale ou cérébrovasculaire ou toute autre hémorragie en cours.
- Ulcère gastrique ou intestinal en évolution.
- Insuffisance sévère, hépatique, cardiaque ou rénale.
- Troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours.
- A partir du sixième mois de grossesse.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Posologie:

1 à 3 ampoules/jour selon l'indication.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT
A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration:

Voie intramusculaire.

En cas de fortes douleurs au moment de l'injection,
arrêtez celle-ci immédiatement.

En cas de prothèse de hanche, l'injection doit être faite du côté opposé.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Grossesse:

La prescription du kétoprofène comme tout autre AINS
ne doit être envisagée que si nécessaire, pendant les 5
premiers mois de grossesse et en utilisation brève.

Allaitement:

Les AINS passent dans le lait maternel. Par mesure de
précaution il convient d'éviter de les administrer chez
la femme qui allaite.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde:

Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale:

- En cas d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique,
une sinusite chronique ou des polypes dans le nez, l'administration
de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme.

•En cas de traitement coagulant concomitant, ce
médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves.

Interrompre immédiatement le traitement en cas
d'hémorragie gastro-intestinale.

Précautions d'emploi :

En raison de la nécessité d'adapter le traitement,
il est important de prévenir le médecin de:

- Antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du
duodénum même ancien).
- Pathologie cardiaque, rénale ou hépatique.
- Asthme provoqué par des médicaments apparentés.

En cas de doute n'hésitez pas à demander l'avis de
votre pharmacien ou de votre médecin.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES:

Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges
de somnolence, de convulsions ou de troubles visuels
dans ces cas, il est conseillé de ne pas conduire ni
d'utiliser des machines.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs
médicaments notamment ceux traitant les troubles de
l'hémostase, il faut signaler systématiquement tout autre
traitement à votre médecin ou votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES:

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez
certaines personnes

entraîner des effets plus ou moins gênants:

Troubles gastro-intestinaux divers, réaction
d'hypersensibilité, troubles respiratoires, troubles
cutanés, aggravation de troubles de fonctionnement
rénal préexistant.

Quelques modifications biologiques peuvent survenir
et nécessitant alors un suivi des bilans sanguin et rénal.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION:

A conserver à une température ne dépassant pas
25°C et à l'abri de la lumière.

DELIVRANCE :

Liste II (tableau C).

FORMES ET PRESENTATIONS:

Kétoprof 100: boîte de 5 ampoules de 2 ml.

AMM N°: 9313101.

Kétoprof 100 : boîte de 2 ampoules de 2 ml.

AMM N° : 9313102.

Ceci est un médicament

Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation
non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode
d'emploi qui vous prescrit.

Suivez le conseil de votre pharmacien.

Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses
indications et ses contre-indications.

N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.

Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre
médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

