

PIRALDENE 20

PIROXICAM 20 mg/ml

Solution injectable IM

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Composition qualitative et quantitative :

Piroxicam : 20 mg.

Excipients : Propylène glycol, Ethanol, alcool benzylique, nicotinamide, phosphate monobasique, Acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium et EPPI qsp 1ml.

Excipient à effet notoire : Ethanol.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Anti-inflammatoire.

INDICATIONS :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans au traitement symptomatique de courte durée de la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante. En raison de son profil de tolérance, le piroxicam ne doit pas être utilisé en traitement de première intention lorsqu'un traitement par AINS est indiqué. La décision de prescrire une spécialité contenant du piroxicam doit être basée sur l'évaluation de l'ensemble des risques spécifiques à chaque patient.

CONTRE INDICATIONS :

Ce médicament est contre-indiqué dans les cas suivants :

- Enfant de moins de 15 ans.
- Femme enceinte à partir du sixième mois de grossesse.
- Femme allaitante.
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté.
- Ulcère gastroduodéal en évolution.
- Maladie grave du foie ou du rein.
- Traitement anticoagulant en cours.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

POSOLOGIE :

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Piraldène 20 est administré par voie intramusculaire en prise journalière unique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

La prescription de piroxicam est déconseillée au cours de la grossesse et surtout au cours du troisième trimestre.

Allaitement :

Par mesure de précaution, il convient d'éviter l'administration de Piroxicam chez la femme qui allaite.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la nécessité d'adapter le traitement, il est important de prévenir votre médecin en cas d'antécédents d'ulcère gastroduodéal ou d'hémorragie digestive, de maladies cardiovasculaires, hépatiques ou rénales, d'allergie ou de crise d'asthme lors de la prise d'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, de contraception par stérilet, de grossesse ou d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anticoagulants, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre pharmacien ou à votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Des douleurs de l'estomac.
- Des vomissements.
- Une crise d'asthme.
- Rarement des douleurs au point d'injection et des sensations de brûlure locale.

Dans certains cas rares, il est possible que surviennent des manifestations cutanées (éruption, prurit), une hémorragie digestive ; il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

SIGNALER A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à l'abri de la lumière.

DELIVRANCE :

LISTE I (TABLEAU A) : SUR ORDONNANCE MEDICALE.

FORMES ET PRESENTATIONS :

Piraldène 20 : Solution injectable, Boite de 2 ampoules de 1 ml.

AMM N° : 9313111.

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

Fabriqué en Tunisie par les laboratoires pharmaceutiques
DORCAS

Z.I. KONDAR 4020 SOUSSE, TUNISIE
Tel : (216) 73 389 795 Fax : (216) 73 389 796