

PRAMIDYLIO

Métoclopramide chlorhydrate 5 mg / ml



IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:

Chlorhydrate de métoclopramide
(s.f. Monohydrate)..... 10,0 mg.

Excipients:

Chlorure de sodium et EPPIqsp 2 ml.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antagoniste de la dopamine. Stimulant de la motricité intestinale.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

- Traitement symptomatique des nausées et vomissements chez l'adulte.
- Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par les antimotilitiques chez l'adulte

CONTRE-INDICATIONS:

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- **Enfant moins de 18 ans**
- Hémorragie, obstruction ou perforation du tube digestif,
- Antécédent de dyskinésie (mouvements involontaires ou inadaptés) due aux neuroleptiques,
- Phéochromocytome,
- Problème rectal récent : inflammation ou hémorragie (suppositoire),
- En association avec les médicaments dopaminergiques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

POSOLOGIE MODE D'ADMINISTRATION:

Selon l'indication:

- Par voie IM: 1/2 à 1 ampoule injectable, 3 fois par jour. Les prises doivent être espacées d'au moins 6 heures.
- Par voie IV: 2 à 10 mg/kg par 24 heures.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Grossesse :

Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation chez la femme enceinte.

Allaitement :

Ce médicament peut être pris ponctuellement pendant l'allaitement sauf en cas de naissance prématurée : l'effet sédatif du médicament serait alors potentiellement préjudiciable chez le nouveau-né.
D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse de toujours demander l'avis de votre pharmacien ou votre médecin avant d'utiliser un médicament.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde:

L'apparition de mouvements anormaux de la tête et du cou est le signe d'un surdosage.

Prévenir immédiatement votre médecin.

En cas de fièvre inexpliquée, associée ou non à d'autres symptômes (pâleur, troubles des fonctions végétatives, troubles de la conscience, rigidité musculaire), arrêter le traitement et prévenir votre médecin.

En cas d'épilepsie, maladie du rein ou du foie, prévenir votre médecin.

Précautions d'emploi:

Ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

Ce médicament ne doit pas être associé aux médicaments dopaminergiques : risque d'annulation réciproque de leurs effets.

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un antihypertenseur ou un sédatif.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE PHARMACIEN OU VOTRE MÉDECIN.

EFFETS INDESIRABLES:

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants:

- Somnolence, lassitude, vertiges et, plus rarement, maux de tête, insomnie, diarrhée et gaz intestinaux, hypotension, sueurs.
- Arrêt des règles, écoulement de lait.
- Mouvements involontaires ou inadaptés, tics, pouvant survenir lors de la première prise (notamment en cas de surdosage) ou, plus tardivement, lors d'un traitement prolongé.
- Exceptionnellement : réaction allergique.

SIGNELEZ À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION:

A conserver à l'abri de la lumière.
DELIVRANCE: Liste I (tableau A)

FORMES ET PRESENTATIONS:

Pramidyl 10: boîte de 4 ampoules pour injection intraveineuse ou intramusculaire. AMM N°:9313052
Pramidyl 10: boîte de 50 ampoules pour injection intraveineuse ou intramusculaire. AMM N°:9313053H

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas le traitement, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

Les laboratoires pharmaceutiques **DORCAS**

Kondar - 4020 Sousse - Tunisie

Tél. : (+216) 73 389 794 / 795 - Fax : (+216) 73 389 796