

PRAMIDYL[®] PER OS

Métoclopramide chlorhydrate 0,1%



IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative :

Chlorhydrate de métoclopramide
(s.f monohydraté).....200 mg.

Excipients :

Hypromellose, cyclamate de sodium, saccharine sodique, acide citrique anhydre, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, arôme abricot-orange et eau purifiéeqsp 200 mL.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antagoniste de la dopamine. Stimulant de la motricité intestinale.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement symptomatique des nausées et vomissements à l'exception de ceux induits par les antimotilitiques.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 18 ans
- Hypersensibilité au métoclopramide ou à l'un de ses composants,
- Hémorragie, obstruction ou perforation du tube digestif,
- antécédent de dyskinesie (mouvements involontaires ou inadaptés) due aux neuroleptiques,
- Phéochromocytome,
- En association avec les médicaments dopaminergiques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

RESERVE A L'ADULTE.

La posologie usuelle est de 5 à 10 ml par prise, 3 fois par jour, avant les repas, en respectant un intervalle d'au moins 6 heures entre les prises.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation chez la femme enceinte.

Allaitement

Ce médicament peut être pris ponctuellement pendant l'allaitement sauf en cas de naissance prématurée : l'effet sédatif du médicament serait alors potentiellement préjudiciable chez le nouveau-né.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

L'attention des utilisateurs de machines et des conducteurs de véhicules est attirée sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde:

L'apparition de mouvements anormaux de la tête et du cou est le signe d'un surdosage.

PREVENIR IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

En cas de fièvre inexpliquée, associée ou non à d'autres symptômes (pâleur, troubles des fonctions végétatives, troubles de la conscience, rigidité musculaire), **ARRETER LE TRAITEMENT ET PREVENIR VOTRE MEDECIN.**

EN CAS D'EPILEPSIE, MALADIE DU REIN OU DU FOIE, PREVENIR VOTRE MEDECIN.

Précautions d'emploi:

Ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé. Il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament chez les sujets épileptiques.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Ce médicament ne doit pas être associé aux médicaments dopaminergiques : risque d'annulation réciproque de leurs effets.

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un antihypertenseur ou un sédatif.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE PHARMACIEN OU VOTRE MEDECIN.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

Somnolence, lassitude, vertiges et, plus rarement, maux de tête, insomnie, diarrhée et gaz intestinaux, hypotension, sueurs.

Arrêt des règles, écoulement de lait.

Mouvements involontaires ou inadaptés, tics, pouvant survenir lors de la première prise (notamment en cas de surdosage) ou, plus tardivement, lors d'un traitement prolongé.

Exceptionnellement : réaction allergique.

Signalez à votre pharmacien ou à votre médecin tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

PRECAUTIONS DE CONSERVATION:

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

DELIVRANCE: Liste I (tableau A)

FORMES ET PRESENTATIONS

PRAMIDYL per os pour adultes boite de 1 flacon

AMM N° 9313051

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas le traitement, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

Les laboratoires pharmaceutiques **DORCAS**

Kondar - 4020 Sousse - Tunisie

Tél. : (+216) 73 389 794 / 795 - Fax : (+216) 73 389 796